

ÉCONAZOLE MYLAN ovule

Antifongique à usage gynécologique

Ce médicament est un générique de GYNO-PEVARYL LP 150 mg

Dans quel cas le médicament ÉCONAZOLE MYLAN ovule est-il prescrit ?

Cet ovule gynécologique contient un antifongique de la famille des imidazolés.

Il est utilisé dans le traitement local des mycoses du vagin et de la vulve, notamment des candidoses.

Présentations du médicament ÉCONAZOLE MYLAN ovule

ÉCONAZOLE MYLAN LP 150 mg : ovule à libération prolongée ; boîte unitaire

Remboursable à 30 % - Prix : 3,44 €

Composition du médicament ÉCONAZOLE MYLAN ovule

p ovule LP

Éconazole nitrate 150 mg

Substance active : Éconazole nitrate

Excipients : Énantate de stéaryle, Galactomannane, Glycérides hémisynthétiques, Silice colloïdale anhydre

Contre-indications du médicament

ÉCONAZOLE MYLAN ovule

Ce médicament ne doit pas être utilisé en cas d'allergie aux imidazolés.

Attention

Si l'infection ne disparaît pas après quelques jours, consultez votre médecin.

Interactions du médicament ÉCONAZOLE MYLAN ovule avec d'autres substances

L'utilisation d'un diaphragme en latex est contre-indiquée pendant le traitement : risque de rupture du diaphragme par altération du latex.

Comme tout traitement vaginal, ce médicament peut diminuer l'efficacité contraceptive des crèmes et des ovules spermicides.

Fertilité, grossesse et allaitement

Grossesse :

Aucun effet néfaste pour l'enfant à naître n'a été établi avec ce médicament. Il peut être prescrit pendant la grossesse

Allaitement :

La possibilité d'un effet du médicament chez le nourrisson est très improbable. Il peut être utilisé chez la femme qui allaite.

Mode d'emploi et posologie du médicament

ÉCONAZOLE MYLAN ovule

L'ovule doit être introduit profondément dans le vagin, de préférence le soir au coucher.

Posologie usuelle :

Une prise unique de 1 ovule ; dans certains cas, ce traitement peut être renouvelé le lendemain matin. Cet ovule a une composition spécifique qui lui permet de rester actif

plusieurs jours après sa mise en place (libération prolongée du principe actif).

Conseils

Introduisez l'ovule en position couchée puis restez allongée pendant 5 à 10 minutes. En fondant dans le vagin, l'ovule peut être à l'origine d'un écoulement gênant : il est conseillé de porter une protection.

Pendant les règles, n'interrompez pas le traitement et évitez de porter des tampons.

En cas de mycoses gynécologiques (candidoses) récidivantes, il est utile de respecter les conseils habituels permettant de prévenir le développement anormal des candida albicans et autres champignons microscopiques :

- limiter la prise d'antibiotiques aux affections nécessitant absolument leur usage. En effet, les champignons sont détruits par certaines bactéries, elles-mêmes tuées par les antibiotiques ;
- lutter contre l'humidité, propice au développement des champignons : bien se sécher avant de mettre ses sous-vêtements, privilégier les culottes en coton qui absorbent mieux la transpiration, ne pas garder son maillot de bain après avoir nagé en piscine, éviter le port de vêtements trop serrés ;
- changer souvent les protections internes ou externes pendant les règles ;
- éviter d'utiliser des savons acides : ils favorisent la multiplication des champignons.

Votre partenaire peut être contaminé alors qu'il ne présente aucun symptôme. **Une consultation médicale est nécessaire pour discuter de l'intérêt d'un traitement.**

Effets indésirables possibles du médicament ÉCONAZOLE MYLAN ovule

Aggravation des brûlures et démangeaisons en début de traitement : ces symptômes traduisent la destruction des champignons microscopiques qui libèrent une substance irritante.

Ces manifestations ne se reproduisent généralement pas lors des applications ultérieures.

Dans le cas contraire, il peut s'agir d'une intolérance ou d'une allergie au médicament : contactez votre médecin.

Laboratoire Mylan